

**Кафедры
психиатрии, психотерапии и
медицинской психологии ФПО
СтГМА**

**клинической психологии
Ставропольского
государственного университета**

**Клиника пограничных состояний
Ставропольской государственной
медицинской академии**



**Доктор медицинских наук,
профессор
Боев Игорь Викторович**

**Доктор психологических наук,
профессор
Ахвердова Ольга Альбертовна**


ПРЕДСТАВЛЯЮТ:



**Медицинские и социально-
психологические последствия
чрезвычайных ситуаций у детей и
подростков**




КОНСТИТУЦИОНАЛЬНО-КОНТИНУАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО ЛИЧНОСТНОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ




Конституциональный диапазон пограничной аномальной личности

Пограничная аномальная личность



- психотипологическая predisпозиция
- типологическая predisпозиция 2-3 органов и/или систем организма
- слабость конституциональных механизмов компенсации и адаптации
- неустойчивость индивидуального барьера адаптации и компенсации
- невысокая толерантность к экзогенным воздействиям
- склонность к аномальному личностному реагированию

Механизмы формирования нарушений психологического и психического здоровья в условиях глобального социально-информационного стрессирования



Аномальная личностная и поведенческая изменчивость и психосоматическая патология:


Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки
Гастроэнтероколиты
Синдром раздраженного толстого кишечника

Гипертоническая болезнь
Ишемическая болезнь сердца и мозга
Транзиторные ишемические атаки мозга


Нейроэндокринные реакции в виде:
гипер- гипофункции щитовидной железы;
гипер- гипофункции коры надпочечников;
диабетических реакций – диабета;
гипоталамо-гипофизарных реакций;
дисфункций половых желез

Нейроиммунная недостаточность:
Нейродермиты;
Бронхиальная астма;
Вторичный иммунодефицит

Распределение личностных психотипов в конституционально-континуальном пространстве по данным сравнительной математической многоуровневой диагностики



Проекции центров средних значений психологических показателей сравниваемых групп на дискриминантную плоскость: акцентуанты и представители ПАЛ, пережившие экстремальные ситуации



Особенности формирования и развития психологических и психопатологических реакций у жертв терроризма:

Норма – акцентуация:



Непатологические
(психологические)
реакции



Психопатологические
реакции



Простой
(нестабильный)
синдром

Пограничная аномальная личность:



Психопатологические
реакции




Простой
(стабильный)
синдром




Сложный
(нестабильный)
синдром

Подростки с шизоидным психотипом диапазона нормы – акцентуации до ЧС



—●— Подростки с шизоидным психотипом диапазона нормы - акцентуации


Подростки шизоидного психотипа диапазона нормы – акцентуации после ЧС



—◆— Подростки с шизоидным психотипом
диапазона нормы - акцентуации


Подростки диапазона ПАЛ до ЧС

Подростки диапазона пограничной
аномальной личности




Подростки диапазона ПАЛ после ЧС

Подростки диапазона пограничной аномальной личности
после ЧС




Многовекторный анализ линейных размеров желудочков и субарахноидального пространства головного мозга по данным КТ у условно-здоровых лиц с высокой толерантностью и больных с функциональными неврологическими расстройствами




◆ Норма с высокой толерантностью ■ Функциональные расстройства

Многовекторный анализ линейных размеров желудочков и субарахноидального пространства головного мозга по данным КТ у больных с функциональными неврологическими расстройствами и энцефалопатией I стадии



—◆— Функциональные расстройства —■— Энцефалопатия I

Многовекторный анализ линейных размеров желудочков и субарахноидального пространства мозга по данным КТ у больных с энцефалопатией I и II стадиями



◆ Энцефалопатия I ■ Энцефалопатия II